


【予防接種回数と対象年齢】

☆定期予防接種



種類	接種対象者	回数		備考
ロタウイルス (経口接種)	生後 6~24 週	2 回 (1 価)		27 日以上の間隔をあけて必要回数を接種。 ※標準 1 回目を生後 2 か月~15 週未満までに接種。
	生後 6~32 週	3 回 (5 価)		※計 2 回は生後 24 週までに接種完了 ※計 3 回は生後 32 週までに接種完了
五種混合 ・ジフテリア ・百日咳 ・破傷風 ・ポリオ ・ヒブ	生後 2 か月~ 7 歳 6 か月になる前日まで ※四種混合、ヒブワクチンを 接種した方は対象外	初回	3 回	20 日以上の間隔をあけて 3 回接種 ※標準 生後 7 か月未満に接種を開始し、20 日~56 日ま での間隔に置いて 3 回接種。
		追加	1 回	初回接種 (3 回) 終了後、6 か月以上の間隔をおいて 接種。 ※ 標準 初回接種終了後、6 か月から 18 か月までの間隔 をおいて接種
	初回接種が、生後 2 か月~ 7 か月になる前日まで	4 回		27 日以上の間隔をあけて 3 回接種後、7 か月以上の 間隔をあけて 4 回目を接種。※生後 12 か月になる前日 までに 3 回目を接種すること
	※生後 7 か月~1 歳になる 前日	3 回		27 日以上の間隔をあけて 2 回接種後、7 か月以上の 間隔をあけて 3 回目を接種。※生後 12 か月になる前日 までに 2 回目を接種すること
	※1 歳~5 歳になる前日	1 回		1 回の接種で終了
小児用 肺炎球菌	初回接種が、生後 2 か月~ 7 か月になる前日まで	4 回		27 日以上の間隔をあけて 3 回接種後、60 日以上の間 隔をあけて 4 回目を接種。 ※3 回目は生後 12 か月までに接種し、4 回目を生後 1 2 か 月以降に接種することが望ましい。
	※生後 7 か月~1 歳になる 前日	3 回		27 日以上の間隔をあけて 2 回接種後、60 日以上の間 隔をあけて 3 回目を接種 ※2 回目は生後 12 か月までに接種し、3 回目は生後 12 か 月以降に接種することが望ましい。
	※1 歳~2 歳になる前日	2 回		60 日以上の間隔をあけて 2 回目を接種
	※2 歳~5 歳になる前日	1 回		1 回の接種で終了
B 型肝炎	1 歳になる前日まで 標準 生後 2 か月~9 か月にな る前日まで	3 回		1 回目から 27 日以上の間隔をおいて 2 回目を接種 3 回目は 1 回目から 20 週以上及び 2 回目から 6 日 以上の間隔をおいて接種
BCG	1 歳になる前日まで 標準 生後 5 か月~8 か月まで	1 回		接種後 27 日間は他の注射生ワクチンを受けられない。
MR (麻しん風 しん混合)	1 歳~2 歳になる前日まで	1 期	1 回	接種後 27 日間は他の注射生ワクチンを受けられない。 ※2 期は 5 歳で案内 (郵送)
	小学校就学前の 1 年間	2 期	1 回	
水痘	1~3 歳になる前日まで	2 回		6~12 か月 (最低 3 か月) 以上あけて 2 回目を接種。 接種後 27 日間は他の注射生ワクチンを受けられない。
日本脳炎	生後 6 か月~90 か月未満 標準 3 歳~4 歳未満	1 期 初回	2 回	6~28 日 (6 日以上) の間隔をあけて 2 回目を接種
	生後 6 か月~90 か月未満 標準 4 歳~5 歳未満	1 期 追加	1 回	1 期 2 回目終了後、6 か月以上 (おおむね 1 年) の間 隔をあけて 3 回目を接種
	9 歳以上 13 歳未満 標準 9~10 歳未満	2 期	1 回	
二種混合	11~13 歳になる前々日まで	1 回		※小学校 6 年生で案内 (郵送)
子宮頸がん	小学校 6 年~高校 1 年生 標準的な接種期間は中 1	2 回 (15 歳未満) 3 回 (15 歳以上)	＜シルガード (9 価) ＞ ◎ 15 歳の誕生日の前日まで 2 回 1 回目から 5 か月の間隔をあけて 2 回目接種。 ◎ 15 歳以上 3 回 1 回目から 2 か月の間隔をあけて 2 回目接種。 1 回目から 6 か月の間隔をあけて 3 回目接種。	

※初回開始が遅くな
ってしまった場合

※初回開始が遅くな
ってしまった場合

☆任意予防接種

おたふく	1歳以上	2回	※2回目は5歳以上7歳未満で接種することが望ましい。 接種後27日間は他の注射生ワクチンを受けられない。
インフルエンザ	生後6か月以上	2回（13歳未満） 1回（13歳以上）	13歳未満は2～4週間の間隔をあけて2回接種 ※中3、高3又はその年齢の方は一部助成あり

【接種にあたっての注意事項】

1 定期予防接種の接種費用は無料です。ただし、次の場合は対象外となります。

- ① 接種時に芽室町に住民登録をしていない方
- ② 指定医療機関以外での接種（町外での接種を希望する場合は、ご相談ください。）
- ③ 接種期間を過ぎての接種や対象年齢外の接種




- 2 接種を受ける場合は、『予防接種と子どもの健康』を必ずお読みください。
- 3 37.5℃以上の発熱時など、予防接種を受けられない場合があります。
- 4 定期予防接種によって引き起こされた副反応により健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく給付を受けることができます。接種間隔を外れて接種を希望する場合は、任意予防接種として独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度の対象となります。
- 5 予防接種に少しでも不安を感じた時は、遠慮せずに相談し、十分に納得した上で受けてください。

【持ち物】

- ① 母子手帳（母子手帳のない方は、健康保険証等身分が証明できる物。過去の接種歴がわかるものをご持参ください。）
- ② 本人確認書類（マイナンバーカード等）
- ③ 予診票（各医療機関にも用意してありますので、当日御記入いただくことも可能です。）



【異なるワクチン間の接種間隔】



【注意】

- 接種から数日間は、発熱や接種部位のはれなどの症状が出ることがあります。規定上接種が可能な期間であっても、必ず、発熱や接種部位のはれなど、体調に問題がないことを確認してから接種してください。
- 同じ種類のワクチンを複数回接種する場合は、規定の接種間隔に従って接種してください。
- 医師が認めた場合、同時接種が可能です。

注射生ワクチン：BCG、水痘、MR、麻しん、風しん、おたふくかぜ **経口生ワクチン**：ロタウイルス

不活化ワクチン：四種混合、二種混合、ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん、日本脳炎、B型肝炎、インフルエンザ、ポリオ



【予防接種と病気の関係】

かかった病気	接種できない期間の目安
麻しん（はしか）等	完全に治ってから4週間
風しん、水ぼうそう、おたふくかぜ等	完全に治ってから2～4週間
突発性発疹、手足口病、伝染性紅斑（りんご病）、プール熱、インフルエンザ、溶連菌感染症、アデノウイルス、ロタウイルス等	完全に治ってから2週間