

芽室町農作物生育状況定期調査報告書（令和8年8月15日現在）

	生育 良否	概 況	生 育 期 節				農 作 業 状 況														
			項目	月 日		遅速	作業名	月 日		遅速 進捗											
				本年	平年			本年	平年												
ばれいしょ	良	・塊茎数は多く、1個重は、中生品種が平年並で、中晩生品種は重い。 ・ライマン価（比重）は、中生品種が平年並で、中晩生品種は高い。 ・収穫作業は、前進栽培および早生品種で始まっている。 ・受入実績から収量は、食用、加工用ともに多い。				早 5	収穫始	-	8/23	3%											
大 豆 (ユキシズカ)	竹良	・茎長は長く、葉数も多い。 ・㎡莢数は、平年よりやや多い。 ・一部ほ場で、ダイズシストセンチュウによる黄化症状がみられる。				± 0															
<table><tr><td></td><td>茎 長</td><td>葉 数</td><td>㎡莢数</td></tr><tr><td>本 年 値</td><td>77 cm</td><td>12.8 葉</td><td>1,415 莢</td></tr><tr><td>平 年 値</td><td>64 cm</td><td>11.2 葉</td><td>1,304 莢</td></tr></table> 注) 莢数は、莢長3cm以上				茎 長	葉 数	㎡莢数	本 年 値	77 cm	12.8 葉	1,415 莢	平 年 値	64 cm	11.2 葉	1,304 莢							
	茎 長	葉 数	㎡莢数																		
本 年 値	77 cm	12.8 葉	1,415 莢																		
平 年 値	64 cm	11.2 葉	1,304 莢																		
小 豆 (きたろまん)	並	・生育は、茎長が平年より長く、軟弱徒長傾向にある。 ・㎡莢数は、莢長5cm以上で少ない状況にあるが、5cm未満を含めた総莢数では概ね平年並である。 ・倒伏は、8日の降雨と風の影響で拡大している。 ・ダイズシストセンチュウによる黄化症状が散見される。				遅 2															
<table><tr><td></td><td>茎 長</td><td>葉 数</td><td>㎡莢数</td></tr><tr><td>本 年 値</td><td>94 cm</td><td>14.1 葉</td><td>278 莢</td></tr><tr><td>平 年 値</td><td>70 cm</td><td>13.4 葉</td><td>320 莢</td></tr></table> 注) 莢数は、莢長5cm以上				茎 長	葉 数	㎡莢数	本 年 値	94 cm	14.1 葉	278 莢	平 年 値	70 cm	13.4 葉	320 莢							
	茎 長	葉 数	㎡莢数																		
本 年 値	94 cm	14.1 葉	278 莢																		
平 年 値	70 cm	13.4 葉	320 莢																		
てんさい	竹良	・根部肥大は、平年を上回っている。 ・褐斑病は、軽微な発生で大きな進展はみられない。				早 5															
			移植				直播														
			草 丈	葉 数	根 周		草 丈	葉 数	根 周												
			本 年 値	75 cm	31.5 葉		38.6 cm	73 cm	25.9 葉		31.5 cm										
平 年 値	66 cm	30.6 葉	35.7 cm	69 cm	26.2 葉	30.7 cm															

芽室町農作物生育状況定期調査報告書（令和8年8月15日現在）

	生育 良否	概 況	生 育 期 節			農 作 業 状 況															
			項目	月 日		遅速	作業名	月 日		遅速 進捗											
				本年	平年			本年	平年												
牧 草	竹良	・ 2 番草の生育は、気温がやや高く推移し適度な降雨があり、雑草の発生も少なく全体的に良好である。 ・ 多くのほ場で出穂期を迎えており、収量は平年以上が期待される。 ・ 全体的に刈遅れによる品質低下が懸念される。 <table><tr><td></td><td>草 丈</td></tr><tr><td>本 年 値</td><td>109 cm</td></tr><tr><td>平 年 値</td><td>84 cm</td></tr></table>		草 丈	本 年 値	109 cm	平 年 値	84 cm			早 7	収穫始	-	8/21	-						
				草 丈																	
			本 年 値	109 cm																	
			平 年 値	84 cm																	
とうもろこし	並	・ 稈長は、平年より長い。 ・ 乳熟期は、熟期がやや遅い品種に替わったことで平年並となっている。 <table><tr><td></td><td>稈長</td><td>葉 数</td></tr><tr><td>本 年 値</td><td>306 cm</td><td>18.9 葉</td></tr><tr><td>平 年 値</td><td>280 cm</td><td>18.4 葉</td></tr></table>		稈長	葉 数	本 年 値	306 cm	18.9 葉	平 年 値	280 cm	18.4 葉	乳熟期	8/14	8/15	早 1						
				稈長	葉 数																
			本 年 値	306 cm	18.9 葉																
			平 年 値	280 cm	18.4 葉																
糊熟期	-	8/27																			
ながいも	並	・ 新生いもの肥大は、平年並である。 <table><tr><td></td><td>いも長</td><td>いも径</td><td>いも重</td></tr><tr><td>本 年 値</td><td>54 cm</td><td>53 mm</td><td>418 g</td></tr><tr><td>平 年 値</td><td>57 cm</td><td>49 mm</td><td>432 g</td></tr></table>		いも長	いも径	いも重	本 年 値	54 cm	53 mm	418 g	平 年 値	57 cm	49 mm	432 g				± 0			
				いも長	いも径	いも重															
			本 年 値	54 cm	53 mm	418 g															
			平 年 値	57 cm	49 mm	432 g															
ごぼう	並	・ 根部肥大は、平年並である。 <table><tr><td></td><td>根長</td><td>根径</td><td>根重</td></tr><tr><td>本 年 値</td><td>59 cm</td><td>16 mm</td><td>89 g</td></tr><tr><td>平 年 値</td><td>59 cm</td><td>17 mm</td><td>92 g</td></tr></table>		根長	根径	根重	本 年 値	59 cm	16 mm	89 g	平 年 値	59 cm	17 mm	92 g				± 0			
				根長	根径	根重															
			本 年 値	59 cm	16 mm	89 g															
			平 年 値	59 cm	17 mm	92 g															
たまねぎ	良	・ 収量は、球肥大が良好であることから平年を上回る見込みである。 ・ 病害は、軟腐病およびりん片腐敗病の発生が多く見られる。				-	収穫始	-	8/19	1%											
スイートコーン （加工用）	竹不	・ 収穫作業は、8 日に始まり、平年並に進んでいる。 ・ 収量は、雌穂がやや細く、平年よりやや少ない見込みである。 ・ 生食用品種の収量は、「ゴールドラッシュ 8 3」ではL 比率が高く、平年よりやや少ない。				早 2	収穫始	8/11	8/12	± 0 18%											
							収穫期	-	8/20												
							収穫終	-	9/12												