



## 芽室町農作物生育状況定期調査報告書（令和5年9月1日現在）

	生育 良否	概 況	生育期節			農作業状況																													
			項目	月 日		遅速	作業名	月 日		遅速 進捗																									
				本年	平年			本年	平年																										
牧 草	やや不	<ul style="list-style-type: none"> <li>2番草の収量は、生草重、乾物重ともに平年より少ない。</li> <li>2番草の収穫作業は、平年より早く終わることが見込まれる。</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>草 丈</th> <th>生草</th> <th>乾物</th> <th>乾物率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年値</td> <td style="text-align: center;">89 cm</td> <td style="text-align: center;">1,069 kg/10 a</td> <td style="text-align: center;">306 kg/10 a</td> <td style="text-align: center;">28.6 %</td> </tr> <tr> <td>平年値</td> <td style="text-align: center;">94 cm</td> <td style="text-align: center;">1,349 kg/10 a</td> <td style="text-align: center;">337 kg/10 a</td> <td style="text-align: center;">25.0 %</td> </tr> </tbody> </table>		草 丈	生草	乾物	乾物率	本年値	89 cm	1,069 kg/10 a	306 kg/10 a	28.6 %	平年値	94 cm	1,349 kg/10 a	337 kg/10 a	25.0 %				-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>収穫始</td> <td style="text-align: center;">8/18</td> <td style="text-align: center;">8/23</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">早 6 85%</td> </tr> <tr> <td>収穫期</td> <td style="text-align: center;">8/23</td> <td style="text-align: center;">9/ 1</td> </tr> <tr> <td>収穫終</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">9/ 9</td> </tr> </table>	収穫始	8/18	8/23	早 6 85%	収穫期	8/23	9/ 1	収穫終	-	9/ 9			
	草 丈	生草	乾物	乾物率																															
本年値	89 cm	1,069 kg/10 a	306 kg/10 a	28.6 %																															
平年値	94 cm	1,349 kg/10 a	337 kg/10 a	25.0 %																															
収穫始	8/18	8/23	早 6 85%																																
収穫期	8/23	9/ 1																																	
収穫終	-	9/ 9																																	
とうもろこし (RM90)	良	<ul style="list-style-type: none"> <li>糊熟期は、平年より15日早く迎えた。</li> <li>早生品種の一部ほ場で、すす紋病、ごま葉枯病の発生が見られる。</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>稈長</th> <th>葉 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年値</td> <td style="text-align: center;">304 cm</td> <td style="text-align: center;">18.0 葉</td> </tr> <tr> <td>平年値</td> <td style="text-align: center;">274 cm</td> <td style="text-align: center;">17.8 葉</td> </tr> </tbody> </table>		稈長	葉 数	本年値	304 cm	18.0 葉	平年値	274 cm	17.8 葉	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>乳熟期</td> <td style="text-align: center;">8/11</td> <td style="text-align: center;">8/24</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">早17</td> </tr> <tr> <td>糊熟期</td> <td style="text-align: center;">8/22</td> <td style="text-align: center;">9/ 6</td> </tr> <tr> <td>黄熟期</td> <td style="text-align: center;">(9/ 3)</td> <td style="text-align: center;">9/20</td> </tr> </table>	乳熟期	8/11	8/24	早17	糊熟期	8/22	9/ 6	黄熟期	(9/ 3)	9/20	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>収穫始</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">9/15</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	収穫始	-	9/15									
	稈長	葉 数																																	
本年値	304 cm	18.0 葉																																	
平年値	274 cm	17.8 葉																																	
乳熟期	8/11	8/24	早17																																
糊熟期	8/22	9/ 6																																	
黄熟期	(9/ 3)	9/20																																	
収穫始	-	9/15																																	
ながいも	良	<ul style="list-style-type: none"> <li>新生いもの肥大は、良好である。</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>いも長</th> <th>いも径</th> <th>いも重</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年値</td> <td style="text-align: center;">79 cm</td> <td style="text-align: center;">60 mm</td> <td style="text-align: center;">996 g</td> </tr> <tr> <td>平年値</td> <td style="text-align: center;">63 cm</td> <td style="text-align: center;">56 mm</td> <td style="text-align: center;">718 g</td> </tr> </tbody> </table>		いも長	いも径	いも重	本年値	79 cm	60 mm	996 g	平年値	63 cm	56 mm	718 g			早16																		
	いも長	いも径	いも重																																
本年値	79 cm	60 mm	996 g																																
平年値	63 cm	56 mm	718 g																																
ごぼう (露地)	良	<ul style="list-style-type: none"> <li>根部肥大は、良好である。</li> <li>収穫作業は、前進栽培が始まっており、平年並に進んでいる。</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>根長</th> <th>根径</th> <th>根重</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年値</td> <td style="text-align: center;">69 cm</td> <td style="text-align: center;">19 mm</td> <td style="text-align: center;">157 g</td> </tr> <tr> <td>平年値</td> <td style="text-align: center;">64 cm</td> <td style="text-align: center;">18 mm</td> <td style="text-align: center;">123 g</td> </tr> </tbody> </table>		根長	根径	根重	本年値	69 cm	19 mm	157 g	平年値	64 cm	18 mm	123 g				早16	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>収穫始</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">9/ 4</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">± 0 3%</td> </tr> <tr> <td>収穫期</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">10/ 3</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	収穫始	-	9/ 4	± 0 3%	収穫期	-	10/ 3									
	根長	根径	根重																																
本年値	69 cm	19 mm	157 g																																
平年値	64 cm	18 mm	123 g																																
収穫始	-	9/ 4	± 0 3%																																
収穫期	-	10/ 3																																	
たまねぎ (移植)	不良	<ul style="list-style-type: none"> <li>収量は、高温により早期に倒伏したことにより球肥大が進まず、平年を下回る見込みである。</li> <li>病害は、軟腐病の発生が見られる。</li> <li>収穫作業は、平年より進んでいる。</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>10a当たり収量 (移植)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年値</td> <td style="text-align: center;">5,500 kg</td> </tr> <tr> <td>平年値</td> <td style="text-align: center;">5,951 kg</td> </tr> </tbody> </table> <small>注) 本年値は、振興センター推定値</small>		10a当たり収量 (移植)	本年値	5,500 kg	平年値	5,951 kg				-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>収穫始</td> <td style="text-align: center;">8/19</td> <td style="text-align: center;">8/20</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">早 6 30%</td> </tr> <tr> <td>収穫期</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">9/ 9</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	収穫始	8/19	8/20	早 6 30%	収穫期	-	9/ 9															
	10a当たり収量 (移植)																																		
本年値	5,500 kg																																		
平年値	5,951 kg																																		
収穫始	8/19	8/20	早 6 30%																																
収穫期	-	9/ 9																																	
スイートコーン	良	<ul style="list-style-type: none"> <li>収量は、生食用および加工用ともに、雌穂重が重いことから、平年を上回っている。</li> <li>収穫作業は、かなり早く進んでいる。</li> </ul>				-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>収穫始</td> <td style="text-align: center;">8/ 7</td> <td style="text-align: center;">8/17</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">早10 73%</td> </tr> <tr> <td>収穫期</td> <td style="text-align: center;">8/17</td> <td style="text-align: center;">8/27</td> </tr> <tr> <td>収穫終</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">9/18</td> </tr> </table>	収穫始	8/ 7	8/17	早10 73%	収穫期	8/17	8/27	収穫終	-	9/18																		
収穫始	8/ 7	8/17	早10 73%																																
収穫期	8/17	8/27																																	
収穫終	-	9/18																																	